

SERESTO

Seresto 1,25 g + 0,56 g coleira para gatos e cães $\leq$ 8 kg. **Número de autorização:** 365/03/11DFVPT. **Data da autorização:** 8 de agosto de 2011. **Espécies-alvo** Felinos (gatos), Caninos (cães). **Indicações de utilização** **Gatos:** Tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides felis*) durante 7 a 8 meses. Protege o ambiente envolvente do animal contra o desenvolvimento das larvas de pulga durante 10 semanas. O medicamento veterinário pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica a Picada de Pulga (DAPP). O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida (mata) (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus turanicus*) e uma eficácia repelente (impede a alimentação) persistente contra infestações por carrapatos (*Ixodes ricinus*) durante 8 meses. É eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos. As carrapatos já presentes no gato antes do tratamento podem não morrer nas 48 horas após a colocação da coleira, podendo permanecer fixadas e visíveis. Assim, é recomendada a remoção das carrapatos presentes no gato no momento da colocação. A prevenção de novas infestações por carrapatos inicia-se nos dois dias após a colocação da coleira. **Cães:** Tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) durante 7 a 8 meses. Protege o ambiente envolvente do animal contra o desenvolvimento das larvas de pulga durante 8 meses. O medicamento veterinário pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica a Picada de Pulga (DAPP). O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida (mata) contra infestações por carrapatos (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) e uma eficácia repelente (impede a alimentação) persistente contra infestações por carrapatos (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) durante 8 meses. É eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos. As carrapatos já presentes no cão antes do tratamento podem não morrer nas 48 horas após a colocação da coleira, podendo permanecer fixadas e visíveis. Assim, é recomendada a remoção das carrapatos presentes no cão no momento da colocação. A prevenção de novas infestações por carrapatos inicia-se nos dois dias após a colocação da coleira. O medicamento veterinário oferece proteção indireta contra a transmissão dos agentes patogénicos *Babesia canis vogeli* e *Ehrlichia canis* pela carrapa vetor *Rhipicephalus sanguineus*, reduzindo assim o risco de babesiose canina e erliquiose canina durante 7 meses. Redução do risco de infeção com *Leishmania infantum* transmitida por flebótomos por um período de até 8 meses. Tratamento de infestação por piolhos picadores/mastigadores (*Trichodectes canis*). **Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo** Não aplicável. **Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais** Manter o saco com a coleira dentro da embalagem exterior até à utilização. Como para qualquer medicamento veterinário, não deixar as crianças pequenas brincar com a coleira ou colocá-la na boca. Os animais que usam a coleira não devem dormir na cama com os seus donos, especialmente as crianças. Enquanto a coleira está colocada, o imidaclopride e a flumetrina são continuamente libertados para a pele e pelo do animal. O medicamento veterinário pode causar reações de hipersensibilidade em algumas pessoas. As pessoas com hipersensibilidade conhecida (alergia) aos componentes do medicamento veterinário devem evitar o contacto com o mesmo. Em casos muito raros, o medicamento veterinário pode causar irritação da pele, ocular e respiratória em algumas pessoas. Em caso de irritação ocular, lavar os olhos abundantemente com água fria. Em caso de irritação da pele, lavar a pele com sabão e água fria. Se os sintomas persistirem, consulte um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Deitar fora imediatamente quaisquer restos ou pedaços cortados da coleira. Lavar as mãos com água fria após a colocação da coleira. **Posologia e via de administração** Uso cutâneo. Uma coleira por animal que deve ser colocada à volta do pescoço. Para gatos e cães pequenos até 8 kg de peso corporal, utilizar uma coleira de 38 cm de comprimento. Apenas para uso externo. **Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária. Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o médico veterinário.**